Fiches reptiles :

Présentation générale de l'animal :

Nom vernaculaire : Anolis brun ou anole brun.
Nom scientifique : *Anolis sagrei.*

Classification : Ordre: Squamates.
Sous-ordre : Sauriens.
Famille : Iguanidés.

Caractéristique permettant l'identification :-Taille : 20 cm.
-Couleurs : Lézard de petite taille, au corps élancé, avec un museau pointu et un fanon gulaire orangé remarquable (expansion de peau sous la gorge). Il change de couleur, du brun au marron foncé -noir, selon les conditions climatiques, l'heure et son humeur (stress, repas...).
-Dimorphisme sexuel : Les mâles ont des figures en forme de diamant sur le dos, et les femelles ont une ligne dorsale blanche ou jaune avec des triangles de part et d'autre.

Caractéristique de l'environnement d'origine :

Zone géographique d'origine : Amérique du Sud.
Caractéristiques du milieu naturel : Il se trouve dans des zones tropicales (forêts primaires, zones boisées, buissons).
Alimentation et comportement en milieu naturel : Insectivore principalement, diurne et arboricole. Athlétique, il court très vite et peut bondir sur de grandes distances pour échapper à un danger quelconque. Les mâles sont territoriaux et déploient souvent leurs gorges rouges afin de défendre leurs territoires contre l'intrusion d'un mâle concurrent. Le changement de couleur est aussi utilisé. En effet la couleur noire donne au mâle une apparence plus impressionnante et agressive lors de la défense de son territoire. En apercevant un danger, par contre, la peur va vite tourner le noir au marron. Les mâles exposent leurs gorges aussi pour séduire les femelles; ils utilisent cet ornement pour paraître plus gros. La cour a d'autres éléments : le mâle va hocher la tête et secouer la queue verticalement en petits mouvements brefs.

Conditions optimales de détention en captivité :

Alimentation en captivité : Insectes (blattes, teignes, criquets, grillons, papillons, etc...), araignées, aliments sucrés (pot pour bébés, nectars artificiels) au quotidien.
Habitat requis : Un terrarium de 80 x 45 x 50 cm .Type tropical humide. Des copeaux de hêtre peuvent être utilisés comme substrat, mais ayant peu d'importance dans la mesure où ces lézards descendent rarement au sol! Prévoir si possible une plante en pot dont la terre sera souvent utilisée comme site de ponte. Etant arboricoles, des branches peuvent être disposées dans le terrarium, avec de nombreuses cachettes.
Paramètres spécifiques de maintenance : Eclairage : Un cycle de 14H par jour. Température : Une température comprise entre 24 et 28°C est nécessaire la journée et 21°C la nuit. Hygrométrie : Taux de 70%! Un bac d'eau permettra d'entretenir un bon niveau hygrométrie, pulvérisations (bi-quotidiennes) d'eau tiède sur le décor pour permettre aux lézards de boire en léchant les gouttes.
Croissance, développement et reproduction en captivité : Longévité de 3 ans environ. Ovipare. Les œufs sont déposés un à un dans un substrat humide. Incubation de 40 jours environ à 28°. Attention à la déshydratation chez les juvéniles. Période de Repos : Entre novembre et février, un repos hivernal est conseillé (9H d'éclairage au lieu de 14H, 21°C le jour et 20°c la nuit).
Détention et règlementation : Non domestique, (aucun statut international).